

## Neue afrikanische Cerambyciden. (Col.)

Von E. Hintz, Südende-Berlin.

*Metopotylus ruficornis* n. sp. — Piceus, nitidus, nigro-pilosus, elytris viridescentibus, metallicis, antennis articulis 1—2 nigris, 3<sup>o</sup> piceo, apice nigro, 4—11 rufis, apice piceis; capite prothoraceque subtiliter punctatis, nitidis, prothorace lateribus rufius punctato, granulato, fere opaco, utrinque granulis duobus majoribus nitidis instructo; scutello impresso; elytris costatis, inter costas fortiter regulariter punctatis, apice rotundatis, angulis suturalibus spinosis; corpore subtus ruguloso-punctato; femoribus disperse punctatis, fere glabris.

Long. 19 mm. Kondué (Congo Belge).

*Saphanodes* n. g.

Generibus *Saphanidus* Jord. et *Metopotylus* Quedf. affine. Corpus elongatum. Caput elongatum, frons brevis, oculi magni, haud divisi; tuberculi antenniferi valde distantes, parum elevati; antennae corpore dimidio longiores, scapus claviformis, elongatus, medium prothoracis fere attingens, articulus secundus minutus, tertius fere longitudine primi, articuli 4—11 sensim decrescentes. Prothorax latitudine parum brevior, basi apiceque transversim impressus, utrinque in medio tuberculo conico instructus. Scutellum parvum, triangulare-rotundatum. Elytra parallela, basi prothorace fere duplo latiora, rectangularia, humeris rotundatis, apice rotundata. Pedes breves, femoribus tertii paris segmentum abdominale secundum parum superantibus, femora parum clavata, tibii secundi paris apice extus incisi, tarsi articulis quatuor compositi, parum dilatati.

*Saphanodes lujae* n. sp. — Brunneus, nitidus; capite prothoraceque fere haud punctatis, glabris, vertice profunde canaliculato; scutello medio impresso; elytris seriebus 5 fortiter punctatis, intervallis parum elevatis, minute punctatis, fere glabris, lateribus carinatis; corpore infra minutissime punctato, pedibus fulvo-brunneis, femoribus in medio et apice piceo-annulatis; antennis fulvo-brunneis, articulo primo glabro, articulis ceteris fulvo-pubescentibus.

Long. 12 mm. Kondué (Congo Belge).

*Iosaphanus* n. g.

Generi praecedenti affine. Corpus elongatum. Caput elongatum, frons brevis; oculi emarginati, lobi inferiores magni, globiformes, lobi superiores minuti; tuberculi antenniferi distantes,

parum elevati; antennae maris corpore fere duplo longiores, articulus primus claviformis, secundus brevis, tertius elytrorum basim attingens, primo longior, quartus longitudine tertii, quintus tertio parum longior, articuli ceteri parum descrescentes; antennae feminae apicem elytrorum attingentes, articuli 8—11 distincte dilatati. Prothorax cylindricus, latitudine longior, in medio modice dilatatus. Scutellum transversum, rotundatum. Elytra parallela apicem versus parum dilatata, basi prothorace in medio parum latiore, fere rectangularia, humeris rotundatis, apice rotundata. Pedes robusti, femora maris fortiter clavata, feminae compressa et apicem versus dilatata, femora tertii paris maris apicem abdominis superantia, feminae haud attingentia, tibii primi paris curvati, tarsi parum dilatati, infra squamosi.

*Isosaphanus ferranti* n. sp. — Viride-metallicus, nitidus, elytris purpurascens, apice coeruleo-argentatus; capite prothoraceque rude punctatis, fronte impresso, vertice breviter canaliculato, prothorace flavo-piloso, lateribus inermi; scutello glabro; elytris rude et dense irregulariter punctatis; corpore infra viridi-metallico, nitidissimo, flavo-crinito; pedibus cyaneis, tibiis tarsisque infuscatis et flavo-pilosis; antennis cyaneis, infra flavo-fimbriatis.

Long. ♂ 13 mm, ♀ 12 mm. — Kondué (Congo Belge).

*Dictator orientalis* n. sp. — *D. postulato* Thoms. affinis. Obscure-cyaneo-pubescentis, capite prothoraceque nigro-velutinus, pedibus antennisque rufus. Capite fortiter granuloso-punctato, antice nitido, fronte et vertice inter oculos canaliculato et carinulato inter antennas praeterea biimpresso, ore rufo; prothorace maris capite duplo latiore, lateribus antice bulbiforme producto, parum pone medium dentato, prothorace feminae antice capite fere haud latiore, lateribus antice triangulariter porrecto, parum pone medium dentato, dorso nodis quattuor instructo, duobus parvis antice et duobus magnis basi, in medio fortiter carinato, fortiter disperse punctato, bulbis densissime granuloso-punctatis; scutello apice nitido et impresso; elytris densissime punctatis, nervis tribus instructis, uno indistincto lateribus, duobus nitidis in dorso; pectore coxisque rufo-pubescentibus, abdomen nitido, crebre punctato; tibiis primi paris modice curvatis.

Long. 33—37 mm. Lukuledi (Deutsch-Ostafrika).

*Ptycholaemus ruedeli* n. sp. — Niger, argenteo-pubescentis; capite dense punctulato, fronte fortiter impresso, inter tuberculos antenniferos elevato, vertice breviter canaliculato; prothorace disperse punctato, nitido, basi utrinque marginato, dorso ante basim impressione semicirculari instructo, lateribus rotundatis; scutello parvo, trianguli, rotundato; elytris minutissime punctulatis,

punctis nonnullis majoribus injectis, humeris parum productis, apice rotundatis, angulis suturalibus fere rectangularibus; corpore infra densissime punctulato; femoribus infra, tibiis infra et extra carinatis, femoribus primi paris fortiter, secundi paris mediocriter et tertii paris parum clavatis, tarsis infra flavo-pubescentibus; antennis nigris, nitidis, parum argenteo-pubescentibus, scapo rude, articulis 2—5 fortiter, articulis ceteris levius punctatis, articulis 7—10 infra apice acute dentatis et canaliculatis.

Long. 14—19 mm. Lukuledi (Deutsch-Ostafrika).

*Monohammus clavatus* n. sp. — Niger, griseo pubescens et maculatus; fronte et genis fascia transversa, vertice pone oculos utrinque vitta, prothoracis disco utrinque supra dentem lateralem fascia longitudinali parum curvata, albis, elytris plus minusve maculose griseo-pubescentibus; capite prothoraceque densissime punctulatis, punctis nonnullis magnis injectis; elytris grosse, apicem versus levius punctatis, basi granulatis, apice rotundatis; corpore infra pedibusque griseo-pubescentibus, abdomine griseo-maculato, sternis albis; antennis corpore sesqui longioribus articulis primis nigris, 3 et 4 basi griseis, 5—11 brunneis, articulo tertio clavato, basim elytrorum superante.

Long. 16 $\frac{1}{2}$  mm. Benito (Congo franç.).

*Monohammus clavifer* n. sp. — Niger, griseo-pubescentis et maculatus; fronte et genis fascia transversa oculis margine postica, prothorace utrinque supra dentem lateralem vitta longitudinali recta, elytris basi pone vittam prothoracis, albis, elytris plus minusve griseo-irroratis; capite prothoraceque densissime punctatis, punctis nonnullis magnis injectis, prothorace disco distinete trituberculato, elytris grosse, apicem versus multo levius punctatis, basi granulatis, apice rotundatis; corpore infra pedibusque griseo maculatis, tibiis apice tarsisque infra flavo-pubescentibus; antennis corpore plusquam duplo longioribus, articulis tribus primis nigris, basi griseis, articulis 4—11 rufo-brunneis, articulo tertio clavato primo duplo longiore elytrorum medium fere attingente.

Long. 17 mm. Benito (Congo franç.).

*Monohammus congolensis* n. sp. — Piceus, capite prothoraceque et corpore infra cervino-pubescentis, elytris griseo-pubescentibus, pone medium fascia communi lata piceo-pubescente ornatis. Capite canaliculato, punctis nonnullis instructo, basi maculis quattuor nigro-velutinis ornato; prothorace basi apiceque transversim bi-impresso, dorso tuberculis 7 instructo, disperse punctato, lateribus fortiter dentato; scutello cervino-pubescente; elytris irregulariter disperse punctatis, basi punctis majoribus; pedibus anterioribus fortiter elongatis, antennis brunneis.

Long. 19—23 mm. Kondué (Congo Belge).

*Monohammus ruficornis* n. sp. — *Monoh. scabioso* Quedf. affinis. Niger, griseo-pubescent; elytris nigro-punctatis, pone medium fascia communis, interdum suture marginaque interrupta ornatis, tibiis, tarsis antennisque rufis, antennarum articulis duobus primis exceptis; capite prothoraceque disperse fortiter punctatis; elytris seriatim punctatis, basi humerisque granulatis; corpore infra pedibusque dense subtiliter punctatis, antennis articulis duobus primis dense subtiliter punctatis, punctis majoribus injectis, articulis 2 et 3 maris incrassatis.

Long. 15—22 mm. Kondué (Congo Belge).

*Oxyhammus konduensis* n. sp. — *O. cincto* Jord. affinis. Niger, griseo-pubescent; capite, prothorace elytrisque brunneis, prothorace infra et lateribus griseo, scutello pallido, in medio nigro, elytris basi humerisque, maculis postbasalibus, fascia transversa communis et apice pallidis; capite prothoraceque densissime subtiliter punctatis, prothorace lateribus fortiter spinoso, basi apiceque transversim recte bisulcato; elytris basi recte truncatis, humeris fere rectangularibus, regulariter punctato-striatis, basi humerisque parum granulatis, apice sinuatis, angulis acuminatis, angulo exteriore longius spinoso; corpore infra pedibusque griseo-pubescentibus, pectore pallidiori tibiis apice et tarsis fulvescentibus; antennis brunneis, articulis apice griseo annulatis.

Long. 11—15 mm. Kondué (Congo Belge).

*Domitia cervina* n. sp. — Nigra, omnino cervino-pubescent, subnitida; capite prothoraceque densissime minute punctatis, capite sulcato, gula fortiter punctata, ore brunneo-piloso; prothorace indistincte carinato, utrinque in medio fortiter tuberculato, basi utrinque punctis quinque majoribus instructo et ad basin tuberculorum fortiter punctato, basi apiceque transversim parallelobisulcato; scutello minute punctato; elytris a basi ad apicem seriatim punctatis; corpore subtus densissime minute punctato, tibiis punctis majoribus injectis, tibiis tarsisque rufo-crinitis; antennis rufo-brunneis, scapo piceo.

Long. 23 mm. Angola.

#### *Pinacosternodes* n. g.

Corpus elongatum. Frons quadratus, parum convexus, oculi divisi, lobi inferiores rotundati, superiores parvi; tuberculi antenniferi distantes, parum elevati; antennae maris corpore plus quam duplo longiores, feminae corpore paulo longiores, scapus brevis, crassus, supra depresso, articulus tertius longus, elytrorum basim superans, articulus quartus tertio parum brevior, articuli ceteri parum decrescentes. Prothorax cylindricus, latitudine parum

brevior, utrinque in medio dente parvo tuberculiformi armatus basi leviter bisinuatus. Scutellum transversum, rotundatum. Elytra convexa, basi prothorace latiora, antice fere parallela, postice attenuata, apice rotundata, humeris productis. Pedes breves, femoribus tertii paris segmentum abdominale tertium vix superantibus, femora incrassata, tibii extus et intus carinati, tarsi dilatati. Processus prosternalis et mesosternalis altitudine coxarum, processus prosternalis productus et antice declivis, processus mesosternalis antice declivis.

Das neue Genus ist mit *Pinacosterna* Har. verwandt. Es unterscheidet sich von demselben durch die Form des Halsschildes, die Fühler, deren erstes Glied bei *Pinacosterna* erheblich länger ist, die Form der Pro- und Mesosternalfortsätze, welche bei *Pinacosterna* viel breiter und flacher sind, und die doppelt gekielten Schienen.

Zu dem neuen Genus gehört *Sternotomis fulvostignata* Quedf.

*P. maculatus* n. sp. — Niger, nitidus, fulvo-maculato-tomentosus; capite prothoraceque dense punctulatis, fronte granulato, fronte verticeque canaliculatis et distinete carinatis, capite ante oculos et lateribus maculato; prothorace lateribus medio dentatis, utrinque trimaculato; scutello nitido; elytris fortiter dense irregulariter punctatis, brevissime nigro-pilosus, plus minusve, praecipue apicem versus, maculose fulvo-tomensis, elytro singulo plagiis majoribus duabus ornatis, una pone basin, altera minori interdum interrupta pone medium sita; corpore subtus cum pedibus brevissime viridi-pubescente, pectoris et abdominis lateribus fulvomentosis, tibiis tarsisque coerulescentibus, tibiis plus minusve fulvo-crinitis, tarsis infra fulvis; antennis griseo-coeruleo pubescens, articulis apice brunneo-maculatis.

Long. 18—22 mm. Kondué (Congo Belge).

*P. uniformis* n. sp. — Niger, nitidus, brevissime coeruleo-pubescentis; capite prothoraceque dense punctulatis, fronte granulato, fronte verticeque canaliculatis et distinete carinatis; prothorace lateribus medio dentatis, lateribus indistincte coeruleo-pubescentibus; scutello intido; elytris fortiter dense irregulariter punctatis, lateribus apiceque indistincte coeruleo-maculatis; corpore infra, pedibus antennisque coeruleo-pubescentibus, tibiis plus minusve fulvo-crinitis, tarsis infra fulvis.

Long. 18—20 mm. Kondué (Congo Belge).

*P. viridis* n. sp. — Niger, opacus, indumento viridi vel griseo-viridi obtectus; capite prothoraceque dense subtiliter punctulatis, fronte granulato, fronte verticeque carinatis; prothorace lateribus medio dentatis; scutello leviter punctato, fere nitido; elytris dense

irregulariter punctatis, maculis indistinctis pone humeros, in medio et ante apicem densius viridi-tomentosis; corpore subtus pedibusque viride-pubescentibus, metasterno lateribus densius albido-viride-pubescente, tibiis secundi paris extus flavo-crinitis; antennis nigris plus minusve, praecipue articulorum basi, griseo-pubescentibus.

Long. 13—18 mm. Kondué (Congo Belge).

*Phrynetta assimilis* n. sp. — *Ph. nigropilosae* Auriv. similis et affinis. Nigra, indumento glauco-cinereo tecta, nigro-variolosa, elytris nigro-fasciata; fronte verticeque canaliculatis; prothorace valde inaequali, tuberculis altioribus, haud applanatis; elytris lateribus fere ad medium seriato-foveolatis, dorso vix ultra basin seriato-punctatis, pilis brevibus nigris obsitis, fascia interrupta postbasali, fascia irregulari antemediana, macula lateralisi post-mediana et maculis duabus anteapicalibus nigris; segmento primo abdominis utrinque macula curvata, segmentis alteris utrinque maculis duabus nigris ornatis; prosterno tuberculo parvo acuto, mesosterno tuberculo valido conico ornatis; tibiis apice et tarsis infra fusco-pubescentibus; antennis piceis, corpore longioribus.

Long. 17 mm. Bibundi (Kamerun).

*Phrynetta aurivillii* n. sp. — Praecedenti affinis. Nigra, indumento glauco-cinereo tecta, nigro-variolosa, elytris nigrofasciata; fronte verticeque nigro-canaliculatis; elytris ultra medium seriato-punctatis, humeris fortiter tuberculatis, punctis pilis longis nigris armatis et undique pilis nigris brevioribus obsitis, fascia interrupta postbasali, fascia irregulari antemediana, macula lateralisi magna postmediana et maculis duabus anteapicalibus nigris; segmentis abdominis nigro-maculatis ut in *Phr. assimili*; prosterno tuberculo parvo acuto, mesosterno tuberculo valido conico, apice recurvato ornatis; tibiis tarsisque rufis; antennis articulis 3—11 rufis, ♂ corpore parum longioribus, ♀ corpore brevioribus.

Long. 16—23 mm. Dibongo et Dschang (Kamerun).

*Phrynetta histrix* n. sp. — Nigra, indumento brunneo undique tecta, haud maculata, antennis rufis, articulo primo cinereo-coeruleo, pedibus cinereo-coeruleis, tibiis apice et tarsis infra brunneo-pubescentibus; fronte verticeque nigro-carinatis; prothorace supra valde inaequali, utrinque lateribus spina valida parum recurvata armato; scutello apice obtuso; elytris ultra medium seriato-lateribus faveolato-punctatis; deinde disperse punctatis, humeris tuberculatis, undique pilis longissimis brunneis obsitis; prosterno tuberculo curvato longo, acuto, mesosterno valido conico armatis; antennis maris corpore parum longioribus, feminae corpore multo brevioribus.

Long. 18—23 mm. Uganda.

*Chreostes argenteus* n. sp. — Griseo-cineraceo- vel argenteotomentosus, brunneo-variegatus, prothorace lateribus, elytris basi et pone medium fasciis et ante apicem macula brunneis ornatis; vertice sulcato; prothorace disco 8-nodoso, nodo postico mediano elongato, sulcato, lateribus utrinque in medio spina valida parum recurvata armato; scutello elongato, apice rotundato; elytris fere ad medium indistincte ruguloso-(deinde levius) punctatis, basi humeris et inter scutellum et humeros tuberculatis, fascia basali valde sinuata, lateribus pone humeros et pone scutellum distincta, fascia postmedia ad latera descendente; corpore infra et pedibus griseo-cinereo-tomentosis, brunneo-maculatis, mesosterno utrinque niveo-tomentoso; antennis flavo-griseis, apicem corporis haud attingentibus.

Long. 30 mm. Entebbe, Uganda.

*Phrystola nitida* n. sp. — Piceo-nigra, nitida, supra puberula grisea vel fusca fere haud conspicua, elytris apice parum distinctiore, elytro singulo in medio macula parva — interdum evanescente — albo-tomentosa, corpore infra, pedibus antennisque griseo- vel fusco pubescens, mesosterno utrinque dense fulvo-ochraceo-tomentoso; capite prothoraceque dense minutissime punctatis, punctis nonnullis majoribus injectis, fronte canaliculato, vertice carinato; prothorace bulbo maximo discoidali globoso, medio sulcato, instructo, lateribus utrinque spina acuta distincte recurvata armato; scutello rotundato, depresso; elytris rugulose punctatis, basi rude granulatis, apice fere laevibus; corpore infra dense minutissime punctato; antennae maris corpore parum longioribus, feminae corpore parum brevioribus. Long. 22 - 27 mm.

Ruwensori, Westseite, 2000—2500 mm (Exped. Herz. Adolf Friedrich) und Uganda.

Bei der Bearbeitung der Ausbente der Expedition S. H. des Herzogs Adolf Friedrich hielt ich die Stücke für abgeriebene *Phr. bulbifera* Kolbe. Inzwischen ist mir aber von verschiedenen Fundorten eine grösitere Anzahl von gleichartigen Stücken zu Gesicht gekommen, so dass ich keine Zweifel habe, dass es sich um eine neue Art handelt.

*Calanthemis montium* n. sp. — Rufo-piceus, griseo-pubescent; capite prothoraceque rude punctatis; capite circa oculos albo-pubescente, prothorace dorso utrinque albo-maculato; scutello minute punctato; elytris dense fortiterque punctatis, basi juxta scutellum elevatis, apice fere rotundatis, angulo marginali minute dentato, fasciis duabus et maculis duabus denudatis, rufo-piceis, fascia basali pone scutellum, fascia anteapicali et utrinque in medio maculis duabus oblongis; corpore infra dense punctato,

griseo-pubescente, femoribus clavatis; antennis brevibus, concoloribus.

Long.  $9\frac{1}{2}$  mm. Mwika (Kilimandjaro, 1100 m).

*Calanthenemis sanguinicollis* n. sp. — Brunneo-piceus, albido-pubescent, prothorace elytrisque flavidio-pubescent, prothorace sanguineo, elytris, lateribus apiceque exceptis, rufo-piceis, elytro singulo lineis duabus parallelis, una antemediana a scutello ad marginem, altera postmediana a suture ad marginem descendantibus, albo-pubescentibus, ornato; capite prothoraceque elytrisque dense fortiterque punctatis, elytris juxta scutellum parum elevatis, apice fere recte truncatis, angulis suturalibus et marginalibus acute dentatis; corpore infra densissime punctato, coxis, pectore et segmentibus duobus primis abdominis albo-apicatis.

Long.  $9\frac{1}{2}$  mm. Tanga (Deutsch-Ostafrika).

*Crossotafera trilineata* n. sp. — Nigro-picea, flavo-griseo-pubescent et maculata, nigro-pilosa, prothorace lineis quinque opacis, tribus dorso et duabus lateribus, elytris parum pone medium fascia transversa plus minusve griseo-pubescente ornatis; capite prothoraceque densissime punctatis et disperse granulatis; prothorace utrinque pone medium dente valido apice recurvato armato; scutello trapezoidal, minute punctato, medio opaco; elytris usque ad medium grosse, pone medium multo levius punctatis, basi inter scutellum et humeros elevatis et tuberculo instructis, apice rotundatis; pedibus dense minute punctatis, tibiis apice nigro-pubescentibus; antennis maris elytrorum apicem parum superantibus, feminae haud attingentibus, piceis, articulis 3—11 basi griseo-pubescentibus.

Long. 9—13 mm. Kondué (Congo Belge) und Bipindi (Kamerun).

*Crossotafrea lineata* n. sp. — Picea, fusco-griseo-pubescent, nigro-brunneo-signata, prothorace lineis quattuor nigro-brunneis, duabus curvatis dorso, duabus lateribus, elytris utrinque plaga laterali nigro-brunnea, ab humeris ad medium extensa et in medio elytrorum angulata; capite prothoraceque densissime minute punctatis, punctis majoribus instructis; prothorace longitudine latiore, utrinque in medio dente valido fortiter recurvato armato; scutello trapezoidal, flavo-pubescent; elytris prothorace multo latioribus, inter scutellum et humeros fortiter productis et elevatis, basi fortiter pone medium multo levius et fere seriatim punctatis, elytro singulo nervis tribus elevatis fusco-pubescentibus instructo, inter nervos griseo-lineatis; abdomine pedibusque nigro-maculatis; antennis brunneis, articulis basi apiceque griseo-pubescentibus.

Long. 11—12 mm. Kondué (Congo Belge).

*Aderpas quadricostatus* n. sp. Piceus, disperse, nigro-pilosus, griseo-aureo-pubescentis. Capite prothoraceque aureo-pubescentibus, capite minute granulose punctato, sulcato; prothorace minutissime punctato, punctis majoribus injectis, lateribus parum pone medium dente valido ornato; scutello fere cordiformi, aureo-pubescente; elytris thorace multo latioribus, humeris productis, rotundatis, apice oblique truncatis, angulo externo haud producto, singulatim quadricostatis, costis aureo-, inter costas griseo-maculatis, basi grosse, apicem versus levius punctatis; corpore infra griseo-pubescente, densissime punctato, pectore punctis majoribus injectis, femoribus praecipue tertii paris fortiter clavatis, tibiis apice, tarsis totis nigris, articulis basi griseo-pubescentibus, antennis maris elytrorum apicem parum, feminae haud superantibus, brunneis.

Long. 7—13 mm. Lindi (Deutsch-Ostafrika).

*Aderpas congolensis* n. sp. — Praecedenti affinis. Nigro-piceus, fusco- vel griseo-fusco-pubescentis. Capite prothoraceque densissime punctatis; prothorace lateribus pone medium dente obtuso armato; scutello fere quadrato, angulis rotundatis, flavo-pubescente; elytris prothorace latioribus, humeris parum productis, rotundatis, apice oblique truncatis, angulo externo producto, singulatim quadricostatis, ultra medium grosse, pone medium multo levius punctatis; corpore infra densissime punctato, griseo-pubescente; femoribus modice clavatis, tibiis apice nigris, tarsis nigris, articulis basi griseis; antennarum articulis basi griseis.

Long. 10 mm. Kondué (Congo Belge).

*Aderpas albomaculatus* n. sp. — Niger, nitidus, maculose albo-pubescentes, albomaculatus; capite dense punctato, fronte canaliculato, vertice carinato; prothorace minutissime punctato, lateribus parum pone medium dente valido armato, lateribus densius albo-pubescente; scutello cordiformi, minute punctato, albo-pubescente; elytris prothorace multo latioribus, humeris parum productis, fortiter rotundatis, apice oblique truncatis, angulo externo indistincte producto, humeris granulatis, basi ultra medium irregulariter grosse, apice levius punctatis, haud costatis, multis maculis albo-pubescentibus ornatis; corpore infra densissime punctato, tenui, pectore lateribus densius albido pubescente; femoribus modice clavatis; antennarum articulis basi albo-pubescentibus.

Long. 7—12 mm. Kondué (Congo Belge).

*Aderpas tessmanni* n. sp. — Praecedenti valde affinis. Niger, nitidus, albo-pubescentis; capite prothoraceque dense minute punctatis, vertice canaliculato, prothorace lateribus pone medium dente parvo conico armato; scutello rotundato, dense punctato; elytris prothorace multo latioribus, humeris parum productis, rotundatis,

apice fere recte truncatis, angulis rotundatis, humeris granulatis, basi ad medium irregulariter grosse, dein levius punctatis, haud costatis, maculis nonnullis densius albo-pubescentibus ornatis; corpore infra densissime punctato, tenui, pectore lateribus densius pallido-pubescente; femoribus parum clavatis; antennarum articulis basi albido-pubescentibus.

Long. 8—11 mm. Uelleburg und Nkolentangan (Spanisch Guinea).

*Aderpas uniformis* n. sp. — Brunneus, dense brunneo-vel griseo-pubescentis; capite prothoraceque dense minute punctatis, fronte verticeque canaliculatis, prothorace lateribus parum pone medium dente conico armato, dorso tuberculis tribus parvis instructo; scutello cordiformi minutissime punctato; elytris humeris rotundatis, apice fere recte truncatis, irregulariter fortiter punctatis, haud costatis; corpore infra minutissime punctato, femoribus maris fortiter clavatis; antennarum articulis basi griseo-pubescentibus.

Long. 8—11 mm. Kondué (Congo Belge).

*Glenea insignis* Auriv. — Zu der Beschreibung ist nachzutragen, dass die 4 letzten Fühlerglieder weiß sind. Das Schildchen ist bläulichweiß.

*Glenea tessmanni* n. sp. — *Gl. mirae* Jord. et *congolensi* m. affinis et similis. Differt ab mira statuta elongatiore, punctura elytrorum leviore et colore situque vittarum albarum capitis et elytrorum. Supra nigro-picea, infra ferruginea, albo-maculata; fronte fasciis duabus juxta oculos, maculis infra oculos lineis curvatis pone oculos albis; prothorace utrinque duabus vittis albis ornato, una pone oculos, altera supra coxas; scutello in medio apiceque albo; elytro singulo vittis duabus basalibus, una inter humerum et suturam suturae fere parallela, longitudine tertii partis elytrorum, altera humerali parallela breviore supra carinam sita, macula quadrata fere in medio, macula apicali fere elytrorum apicem attingente et sutura albis; pedibus totis rufis, antennis nigris.

Long. 10—13 mm. Uelleburg, Nkolentangan (Spanisch Guinea).

*Glenea ashantica* n. sp. — *Gl. giraffae* Dalm. affinis. Nigra, albo-vittata et maculata; capite prothoraceque fortiter punctatis; elytris basi grosse seriato-punctatis — elytro singulo seriebus tribus — pone medium irregulariter fortiter punctatis, apice bispinosus; fronte et genis verticeque lineis duabus albis, fronte in medio nigro, prothorace vittis septem albis; scutello nigro, apice albo; elytro singulo vittis duabus basalibus parallelis dimidium elytrorum haud attingentibus, macula mediana rotunda,

macula parva postmedia, macula rotunda anteapicali, macula apicali — apicem hand attingente — sutura et margine albis, his maculis quattuor prope carinam sitis; corpore infra nigro, albomaculato, abdomine brunnescente, pedibus totis ferrugineis, antennis piceis.

Long.  $8\frac{1}{2}$ —9 mm. Ashanti.

*Glenea variabilis* n. sp. — *Gl. occidentali* Jord. et *sjöstedti* Auriv. affinis, cum *Gl. sjöstedti* fortasse solomodo forma *occidentalis* Jord. Piceo- vel rufo-brunnea, capite prothoraceque nigra, supra vittis maculisque flavis, infra albis ornata; capite disperse punctato, genis, vittis duabus frontis lateribus, lineis curvatis pone oculos flavis; prothorace densius punctato, utrinque vittis lateralibus duabus, una pone oculos altera supra coxas, lateribus inter eas vitta obsoleta; scutello brunneo; elytris inter vittas et maculas grosse, parte basali seriatim, punctatis, apice bispinosis, elytro singulo vittis duabus basalibus, una inter scutellum et humerum tertiam partem elytrorum haud superante, altera juxta carinam lateralem medium superante, macula mediana suturam attingente, macula apicali apicem elytrorum fere attingente et sutura flavis; pedibus totis flavis, antennis nigris.

Long.  $11\frac{1}{2}$ —14 mm. Nkolentangan, Alen (Spanisch Guinea).

Die Art scheint in der Färbung sehr stark zu variieren; so fließen bei einigen Stücken die Mittelflecke mit den beiden Längsbinden zusammen, bei anderen Stücken fehlen die Mittelflecke und die dem Seitenkiel parallelaufende Binde ist bis ins letzte Drittel der Flügeldecken verlängert.

*Glenea puella* Chevr. — Zur Beschreibung ist nachzutragen, dass das Schildchen ganz weiss ist. Unterhalb des Seitenkiels der Flügeldecken befindet sich meist noch ein weisser Parallelstreifen, der sich manchmal mit dem Fleck auf der Mitte der Flügeldecken verbindet. Der erste Längsstreifen ist manchmal verkürzt. Die Naht ist weiss. *Gl. assimilis* scheint eine ziemlich konstante Form aus Spanisch Guinea und vom Kongo zu sein. Bei ihr ist das Schildchen nur hinten weiss. Der Parallelstreifen neben dem Seitenkiel fehlt. Die Art besitzt wohl höchstens den Wert einer Subspezies. *Glenea atra* Jord. ist nach Durchsicht des vorliegenden gröfseren Materials nur als var. von *ossifera* Jord. zu bezeichnen, da alle Übergänge von der einen zu der anderen Form vorliegen.